

หยุดโลกร้อน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยออร์แกนิก ทีพีไอ

การใช้ปุ๋ย ทีพีไอ กับ การปลูกลำไย

1. ช่วงระยะหลังการเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่ง เตรียมต้นลำไย (ประมาณ 4-5 เดือน)

ทางดิน

ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้ำค้างคาว 50 กก. +
pH 11 พลัส 50 กก. + ไโดโลไมท์ 500
อัตรา 50 กก. คลุกเคล้าให้เข้ากัน
ผสมกับ ปุ๋ยเขียว 3 ลิตร + น้ำส้ม
ควันไม้ 1 ลิตร
หว่านรอบทรงพุ่ม 3-5 กก./ต้น



ทางใบ

ผสมปุ๋ยม่วง 4-5 ฝา + น้ำส้มควันไม้ 4-5 ฝา
ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ ทุก 15 วัน



เพิ่มภูมิคุ้มกันทานโรคและแมลง เร่งกระตุ้นการแตกใบอ่อน บำรุงต้น

2. ช่วงระยะใบแก่จนถึงออกดอก (ประมาณ 1.5-2 เดือน)



เร่งดอก

ทางใบ

ผสมปุ๋ยม่วง(เร่งดอก) 4-5 ฝา + น้ำส้มควันไม้ 4-5 ฝา
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุก 15 วัน
เริ่มเห็นตาดอกถึงก่อนดอกบาน
หมายเหตุ : ระยะดอกบานเต็มที่ ให้หยุดการฉีดพ่นปุ๋ย



เราสร้างอนาคต

เร่งการออกดอก ช่วยการยืดช่อดอกของลำไย เพิ่มการติดผล

หยุดโลกร้อน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยออร์แกนิก ทีพีโอ

3. ช่วงระยะติดผลอ่อน และผลเริ่มเปลี่ยนสี (ประมาณ 3 เดือน)

ทางดิน

ปุ๋ยเม็ด/ผงถ้ำค้างคาว 50 กก. +
pH 11 พลัส 50 กก. + โดโลไมท์ 500
อัตรา 50 กก. คลุกเคล้าให้เข้ากัน
ผสมกับ ปุ๋ยเขียว 3 ลิตร + น้ำส้ม
คว้นไม้ 1 ลิตร
หว่านรอบทรงพุ่ม 3-5 กก./ต้น



บำรุงผล

ทางใบ

ผสมปุ๋ยม่วง(หวาน) 3 ฝา + น้ำส้มคว้นไม้
3 ฝา ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน



บำรุงขั้วผล บำรุงผลให้สม่ำเสมอ ผลโตสม่ำเสมอ ชับได้และป้องกันกำจัดโรคแมลง

4. ช่วงระยะผลโตเข้าเม็ดดำจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยว (ประมาณ 2 เดือน)



บำรุงผล

ทางใบ

ผสมปุ๋ยม่วง(หวาน) 3 ฝา + น้ำส้มคว้นไม้
3 ฝา ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 15 วัน



เราสร้างอนาคต



บริษัท ทีพีโอ โพลีนี ซีเวอินทรีย์ จำกัด

26/56 ถนนฉัตรดาราใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 www.tpiolene.co.th

E-mail : salesbio@tpiolene.co.th โทร. 0-2678-6888 โทรสาร 0-2678-6898

