



โรคราน้ำค้าง ปัญหาใหญ่ของชาวเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา ลักษณะอาการของโรค เปลือกยางพาราจะร้อน
จนเห็นแก๊สน้ำไม้ จนทำให้ระบบท่อลำเลียงขาด



ผลิตปริมาณน้ำยางลด
น้อยลง น้ำยางที่ได้ส่วนใหญ่
เป็นน้ำเสีย จึงเป็นเหตุให้
เปอร์เซ็นต์น้ำยางต่ำ

หยุด การเลือกใช้ปูนแดงทา

หน้ายาง ซึ่งยิ่งเป็นการแก้ปัญหา
ระยะสั้น ซึ่งการแก้ด้วยวิธีนี้ เป็น
สาเหตุของยางหน้าตายนี้ตามมา

เพราะเนื่องจากการใช้
ปูนแดงทาก้นกรีต ถูกต้อง
หน้ากรีตจะแห้งเป็นผล
ทำให้ รากเส้นดำหยุดการ
แพร่ระบาดทันที แต่แค่
ชั่วคราว



ผลจากการใช้ปูนแดง หรือดินทาก้นกรีตส่วนใหญ่
มักจะมีผลผสมสารเคมีเล็กน้อย ซึ่งทำให้เกิดการตายของ
เซลล์บริเวณนั้น

ผลจากการใช้เคมีสารเร่ง หรือ ผลจาก
การการใช้ปูนแดง



แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตชาวสวนยางก็เปลี่ยน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยม่วง ทีพีไอ ทาหน้า
กรีด หรือ ฉีดพ่นให้รอบลำต้นยางพารา ช่วยป้องกันการเกิดราเส้นดำ และป้องกันปัญหาหน้า
ยางตายหนึ่ง **สร้างภูมิคุ้มกันทาน โรคและแมลง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต**



ใช้ปุ๋ยม่วง 5 ซ่อนโตะ ต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออัตราไม่เกิน 1:400 สำหรับยางพาราช่วงก่อนเปิดกรีดจนถึงอายุไม่เกิน 15 ปี
หลังการใช้ปุ๋ยม่วง มีผลทำให้เปลือกนิ่มและน้ำยางจะไหลออกดีมากเป็นน้ำยางดิบ มีความเข้มข้น ของเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง ห้ามใช้เกิน
อัตราที่แนะนำ เพราะอาจทำให้หน้ากรีดนิ่มจนเน่าได้ เนื่องจากเปลือกผิวลำต้นยางยังอ่อน

ใช้ปุ๋ยม่วง 10 ซ่อนโตะ ต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออัตราไม่เกิน 1:200 สำหรับยางพารา ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้วิธีฉีดพ่น หรือใช้แปลงทาสี
ทาหน้ากรีด ยางหน้ากรีดปกติใช้ปุ๋ยม่วงทุก 20—30 วัน กรณียางตายหนึ่งให้ใช้น้ำส้มควันไม้ 10 ซ่อนโตะ ต่อน้ำ 20 ลิตรผสมร่วมกับ
กับปุ๋ยม่วงไปด้วย หากที่มีปัญหาเปลือกแห้งหรือหน้ายางตายหนึ่งให้ใช้ ทุก 10 วัน ประมาณ 5 เดือน ก็จะกลับมาเปิดกรีดได้เป็นปกติ

ผลจากการใช้ปุ๋ยม่วง ทีพีไอ กรีดนิ่ม น้ำยางเพิ่ม เปอร์เซ็นต์สูง
หน้ากรีดไม่มีผลเส้นดำ การสร้างเปลือกใหม่ ตายหนึ่งหาย

