

“ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ปลอดสารปฏิชีวนะ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยสารเสริมชีวนะสัตว์ ทีพีไอ”

โรคท้องเสีย โรคอหิวาต์สุกร ที่สำคัญในสุกร

โรค Colibacillosis (E.coli)



ระยะที่พบ

สุกรตุนนม และสุกรอนุบาล
โรคท้องเสียจากโรคไวรัส
โรคบิดมูกเลือด

โรค PED/พีอีดี



ระยะที่พบ

สุกรตุนนม และสุกรอนุบาล
ท้องเสียขนาดในทุกอายุ

โรค Coccidiosis (โรคบิด)



ระยะที่พบ

ลูกสุกรตุนนม 5-15 วัน

โรคท้องเสียจากซัลโมเนลล่า



ระยะที่พบ

สุกรอนุบาลช่วงปลาย และ
สุกรขุนระยะเล็ก-รุ่น

หมายเหตุ : รูปภาพใช้ประกอบอาการของโรค จาก Internet

ใช้ **ทีพีไอ-ซินไบโอติกส์** และ **โปรไบโอติกส์**

ป้องกันและรักษา ได้โดยวิธี



1. ลูกสุกรหลังคลอดตอนตัดเชี้ยวตัดหาง ให้ปริมาณ 1-5 ซีซี บั้มปาก
ทุก เช้า และ เย็น เพื่อป้องกันอาการท้องเสียจากเชื้อแบคทีเรีย
2. บั้มปาก 1 ซีซี ต่อ น้ำหนักสุกร 1 กก. ในลูกสุกรที่มีอาการท้องเสีย
3. ผสมในน้ำสะอาดให้ลูกสุกรกินในอัตรา 1-2 x ช่วยลดการเกิดท้องเสีย
4. ผสมอาหารชั้นให้ลูกสุกร กินอัตรา 1-2 x ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านทานโรค
และลดอาการเกิดท้องเสีย

เราสร้างอนาคต



บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด
26/56 ถนนฉัตรดารา 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 www.tpiolene.co.th
E-mail : salesbio@tpiolene.co.th โทร. 0-2678-6888 โทรสาร 0-2678-6898

